

我的 Lumvoda 輸注提醒和治療 進度追蹤表

善用資訊及支援，輕鬆應對
每一次 Lumvoda 輸注

用途及重要安全資訊

用途： Lumvoda 是一種處方藥物，用於治療甲狀腺眼病（Thyroid Eye Disease, TED），無論您已患 TED 數月還是數年。

我應了解哪些關於 Lumvoda 的最重要資訊？

輸注反應可在您輸注 Lumvoda 期間或之後不久發生。如果您在 Lumvoda 治療期間或之後出現以下任何症狀，請立即告訴您的醫生或護士：

- 高血壓
- 頭痛
- 感覺熱
- 疲倦
- 發冷

請參閱[第 4 和第 5 頁](#) 的重要安全性資訊和完整[處方資訊](#)。

Lumvoda™
veligrotug-vvze

VIRIDIAN™
cares

為 Lumvoda 輸注做好準備的有用貼士

以下貼士有助您為治療旅程做好準備

輸注前 2 週

- 確認您的預約日期、時間及地址
- 在開始治療前，請致電您的醫生，以確認是否需要進行任何額外的評估
- 安排休假、托兒服務和其他职责的代办事宜，為您缺席做好準備
- 與您的病人就醫聯絡專員（Patient Access Liaison, PAL）確認

輸注前 1 週

- 確認往返約診的交通
- 如果您在輸注期間需要支援，請聯絡朋友或家人

您的 PAL 是整個治療旅程中不可或缺的支援資源。請致電 1-866-VCARES1 與他們聯絡，服務時間為星期一至星期五，美國東部時間上午 8 時至晚上 8 時。

請參閱第 4 和第 5 頁的重要安全性資訊和完整處方資訊。

輸注當天

抵達後，您將先辦理登記手續並安頓下來，護士會處理其餘事項。請盡量利用這段時間休息、閱讀或放鬆。以下貼士可能有助於您獲得更順暢的治療體驗。



離家前吃一頓健康、均衡的膳食。



多喝水。



穿著舒適的衣物，並確保手臂易於露出以便進行每次輸注。



在包裡裝上一些水、小食、娛樂用品、充電器，以及任何能讓您在輸注期間感到舒適的其他物品。



請攜帶此追蹤表，以便熟悉輸注後醫療方案！

每次輸注後的貼士

我們希望您的輸注過程順利！

以下是輸注完成後的一些貼士。

- 安排下一次輸注 — 由今天起計 3 週後
- 記下今天想帶但沒帶的物品，或下次輸注時想帶備的物品
- 請聯絡您的醫生或護理團隊，讓他們知道您的輸注情況
- 留意任何可能的副作用。有些副作用可能在您輸注期間或之後不久發生。如果您認為自己正在經歷副作用，請立即告訴您的護理團隊
- 如果您已參加 ViridianCares，請與您的 PAL 跟進，以確認已接受輸注並解決任何未解決的問題

→ 喝水、休息，好好照顧自己！



請務必在第 4 頁記下您的預定輸注日期

您的 PAL 是整個治療旅程中不可或缺的支援資源。請致電


1-866-VCARES1 與他們聯絡，服務時間為星期一至星期五，美國東部時間上午 8 時至晚上 8 時。

請參閱第 4 和第 5 頁的重要安全性資訊和完整處方資訊。

我的 Lumvoda 治療計劃

追蹤您的治療，每次一次輸注

您的 Lumvoda 治療應該只需 12 週即可完成（從開始到結束），共五次輸注，每次 30 至 45 分鐘，每 3 週一次。



每隔 3 週一次單劑靜脈輸注，持續 12 週



第一次輸注



45 分鐘

後續輸注



30 分鐘
如果耐受性良好

IV，靜脈。

Lumvoda™
veligrotug-vvze

VIRIDIAN™
cares

使用下表記錄您的輸注時間表及整個治療旅程中的進度

	第 1 次輸注 (第 0 週)	第 2 次輸注 (第 3 週)	第 3 次輸注 (第 6 週)	第 4 次輸注 (第 9 週)	第 5 次輸注 (第 12 週)
輸注日期					
輸注時間					
地點					
每次治療後，記下您 TED 症狀的任何變化。如有任何變化，請務必與您的護理團隊討論。					
備註					

如果您已參加 ViridianCares，且在按時赴約或負擔治療費用方面遇到困難，請聯絡您的 PAL 尋求協助。



如果您錯過預定的 Lumvoa 輸注，請立即聯絡您的護理團隊重新安排。

用途及重要安全資訊

用途：Lumvoo 是一種處方藥物，用於治療甲狀腺眼病（Thyroid Eye Disease, TED），無論您已患 TED 數月還是數年。

我應了解哪些關於 Lumvoo 的最重要資訊？

輸注反應可在您輸注 Lumvoo 期間或之後不久發生。如果您在 Lumvoo 治療期間或之後出現以下任何症狀，請立即告訴您的醫生或護士：

- 高血壓
- 頭痛
- 感覺熱
- 疲倦
- 發冷

Lumvoo 可能令炎症性腸病（Inflammatory Bowel Disease, IBD）

（如克隆氏症或潰瘍性結腸炎）惡化。如果您的 IBD 症狀惡化，請立即告訴醫生；這些症狀可能包括：腹瀉並伴隨胃痛或絞痛、糞便帶血、突然急需排便，或感覺需要排便但只能排出少量或沒有糞便。

Lumvoo 可能導致血糖升高。在開始 Lumvoo 治療前，如果您有高血糖或患有糖尿病，請告訴您的醫生。按醫生指示接受治療及遵從適當的飲食以控制血糖，對您非常重要。

Lumvoo 可能引起嚴重的聽力問題，包括聽力喪失，部分情況下這可能是永久性的。如果您有任何聽力問題或聽力變化的病徵或症狀，請告訴您的醫生。

請參閱[下一頁](#)的其他重要安全性資訊和完整[處方資訊](#)。

LumvooTM
veligrotug-vvze

VIRIDIANTM
cares

用途及重要安全資訊（續）

在接受 Lumvoda 之前，如果您有以下情況，請告訴您的醫生：

- 患有炎症性腸病（如克隆氏症或潰瘍性結腸炎）。
- 患有糖尿病或知道您的血糖偏高。
- 已懷孕或計劃懷孕。Lumvoda 可能對您未出生的嬰兒造成傷害。如果您在 Lumvoda 治療期間懷孕或懷疑自己懷孕，請告訴您的醫生。具生育能力的女性應在開始治療前、治療期間和最後一劑 Lumvoda 後 6 個月使用有效的避孕方法（生育控制）。
- 正在餵哺母乳或計劃餵哺母乳。目前未知 Lumvoda 會否傳入母乳。請與您的醫生討論在 Lumvoda 治療期間餵哺嬰兒的最佳方法。
- 您正在服用的所有藥物，包括處方藥及非處方藥、維他命，以及膳食及草藥補充劑。了解您正在服用的藥物。保存一份藥物清單，在您取得新藥物時向您的醫生和藥劑師出示。

Lumvoda 有哪些可能的副作用？

Lumvoda 最常見的副作用包括肌肉抽筋或痙攣、頭痛、聽力問題、高血糖、疲倦、腹瀉、耳部不適、輸注反應、噁心、感冒樣症狀、一種名為肌酸磷酸激酶的血液酶升高、皮膚乾燥和高血壓。

以上並非所有可能副作用的完整清單。如果您有任何副作用，請告訴您的醫生或治療團隊。我們鼓勵您向 FDA 報告處方藥物的不良副作用。請瀏覽 www.fda.gov/safety/medwatch 或致電 1-800-FDA-1088。

Lumvoda（500 毫克）是輸注用注射劑。

請參閱完整[處方資訊](#)。



© 2026 Viridian Therapeutics, Inc. 保留所有權利。
Lumvoda™ (veligrotug-vvze)、ViridianCares™ 及相關商標為
Viridian Therapeutics, Inc. 所有。US-LV-0034 2026 年 9 月

